

披衣菌性病

臺灣皮膚科醫學會提供

前言

披衣菌感染是最常見的性傳染疾病之一，主要經由性接觸傳染，好發於性行為頻繁的青年及青少年。通常披衣菌感染的症狀並不明顯而不易發現，所以患者不會尋求醫療諮詢，在持續感染下，更容易造成併發症與後遺症。

披衣菌性病的症狀為何？

披衣菌性病是個「沉默的」疾病，大多數的患者沒有症狀。少數患者在感染一至三週（一般比淋病雙球菌感染晚）後出現小便疼痛等不同的症狀。女性常見的症狀包括：排尿有灼熱感、陰道分泌物增加、性交疼痛、下腹痛、下背痛、噁心、嘔吐、發燒及經期間不正常出血等；男性則有尿道出現分泌物、睪丸腫脹疼痛等症狀。

披衣菌性病的併發症和後遺症為何？

由於披衣菌性病通常沒有症狀，因此不易發現也常延誤或疏於治療。在女性，可能出現子宮頸炎、子宮內膜炎、輸卵管炎與卵巢發炎、骨盆腔發炎性疾病及不孕等併發症和後遺症，也可能導致子宮外孕的機率上升。孕婦感染披衣菌若未治療，可能造成新生兒結膜炎及新生兒失明；嚴重將導致新生兒肺炎或其他呼吸道疾病，甚至引發死亡。在男性，則可能有副睪炎、攝護腺炎或不孕症的情形發生。

如何診斷披衣菌性病？

披衣菌性病的診斷以實驗室檢查為主，可做抹片檢查、細胞培養或抗原測定等。主要採集男性尿道口或女性子宮頸內膜檢體，亦可留睡醒第一泡尿的前段尿液做檢驗。

如何治療披衣菌性病？

披衣菌性病是容易治療且可以被治癒的。治療上主要使用四環黴素與紅黴素類藥物。可使用 Azithromycin 單劑治療，或 Doxycycline、Tetracycline 連續治療一週。對於新生兒或是已懷孕或可能懷孕之女性則使用 Erythromycin。此外，性伴侶也必須同時接受治療，避免交叉感染。

如何預防披衣菌性病？

披衣菌感染主要經由性接觸傳染，所以安全的性行為最為重要，不論陰道性交，肛交或口交，都要全程使用保險套。最好有固定單一的性伴侶。有任何可疑的症狀則要尋求專科醫師的幫忙，確定診斷並接受完整治療。