

熱門：

[老廢物Bye](#)
[植髮際線](#)
[減敏療法](#)
[熬夜爆肝](#)

討論：

[健康活動](#)
[抽脂『消風』](#)
[希望駱跡](#)
[經痛健康操](#)

影片專區 線上廣播 院所導覽

新聞快訊

新聞補給站

健康部落格

醫美天地

癌症百科

健康專輯

樂活玩家

公益專區



lativ 極暖羽絨 \$1580

Google YAHOO! PChome  
sina 新浪台灣 msn  
各大入口網站，即時健康資訊  
其他聯播平台 (more...)

首頁 &gt; 新聞快訊 &gt; 最新新聞 &gt; 服藥前基因檢測 就可避免SJS

## 服藥前基因檢測 就可避免SJS



服藥前基因檢測 就可避免SJS

健康醫療網／張郁梵報導 2013/11/15

吃止痛藥，竟然是一連串惡夢的開始？！徐先生幾年前因腳痛而服用醫師開立的抗癲癇藥物卡巴氮平，沒想到一週後竟出現皮膚潰爛、口腔潰瘍、全身體無完膚，就醫後確診是因藥物過敏導致罹患史蒂文斯強生症候群（Stevens-Johnson syndrome，簡稱SJS）。所幸在台灣醫療團隊的研究下，已成功發現造成SJS的基因，民眾只要在服用抗癲癇藥物前抽血檢測，就可以減少罹患SJS的機率。

長庚紀念醫院皮膚科副教授暨藥物過敏中心主任鐘文宏表示，當民眾出現癲癇、手麻、腳麻等神經痛、或家庭主婦常有的腕關節症候群時，醫師常會開立傳統抗癲癇藥物〈carbamazepine〉；然而，根據美國食品藥物管理局在2007年公布的數據，一樣的抗癲癇藥物〈carbamazepine〉，在美國每10萬人僅2人發生SJS，但在台灣卻高達59人！

近年來，台灣醫療團隊致力研究藥物過敏，發現了最常引起過敏的兩種藥物的相關基因。其中一個是抗癲癇藥物〈carbamazepine〉所引起的SJS，主要是與負責免疫反應的基因型〈人類血球蛋白抗原HLA-B\*1502〉有關；也因為這項重要研究發現，使得台灣開始健保給付初次處方抗癲癇藥物的病人，可以在用藥前先抽血檢測，避免發生嚴重的過敏反應。

另一個藥物則是國人常用的降尿酸用藥〈allopurinol〉所引發的過敏反應，其實是和HLA-B\*5801有關，且風險值更是一般人的500倍。根據健保資料庫統計，該藥物在台灣每年造成20人死亡，特別是腎功能不好和年紀較大的長者，更是罹病的高危險群。

值得注意的是，台灣研究團隊又有新的突破，成為全球第一個發現第三種最常見引起過敏的抗癲癇藥物〈phenytoin〉和基因的關聯。相關研究也將在11月16日和17日於長庚大學舉辦的第八屆國際嚴重藥物過敏大會發表，這也是國際藥物大會第一次在亞洲舉辦。

健康醫療網：<http://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=12132>

讚 成為你朋友中第一個說這讚的人。


 在 Google 上推薦這個網址

 分享：  



順天堂 註冊成字第09004號 中市衛中藥字第 10110003號

悅來順 濃縮膠粒

改善經期疼痛 解決經期不適



B肝帶原者必備護肝APP

全方位照護肝臟健康，遠離肝癌威脅



CHIA 333

老廢物! 終結戰

和體內老廢物說掰掰

馬上市上GO



守胃健康 腸保幸福

解答胃腸問題小百科。與您分享腸胃毛病二三事